農業部農業試驗所

Taiwan Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture

中華民國114年11月 2025/11

甘藷種原圖說（二） *Ipomoea batatas* (L.) Lam. Germplasm Illustrations (II) 農業部農業試驗所出版

農業部農業試驗所特刊第250號

深耕農業百卅載 創新科研耀新篇

Taiwan Agricultural Research Institute

甘藷種原圖說（二）

Ipomoea batatas (L.) Lam. Germplasm Illustrations (II)

甘藷種原圖說(二)

Ipomoea batatas (L.) Lam. Germplasm Illustrations (II)

農業部農業試驗所
Taiwan Agricultural Research Institute,
Ministry of Agriculture

中華民國114年11月 2025/11

序言

甘藷〔*Ipomoea batatas*(L.) Lam.〕為旋花科、甘藷屬植物，原產地分布於以墨西哥為中心之熱帶美洲地區，別名有地瓜、番薯、白藷或山芋等，其為世界重要的糧食、飼料及能源作物。隨著國人飲食習慣及食用型態之轉變，對甘藷加工利用的需求逐年提升，加上政府推廣水、旱田輪作並建立契作產銷體系，因此，根據《農業統計年報(113年)》顯示，國內甘藷栽培面積已達9,404公頃，每公頃平均產量23,374公斤，全年總收穫量達219,491公噸；若以縣市栽培面積而言，則以雲林縣4,635公頃最大，其次是彰化縣1,574公頃，此對穩定我國雜糧消費市場供需平衡頗有助益，近年更有467公噸冰烤地瓜等優質產品行銷日本、美國等地，出口總值達到5,870萬元。

本所嘉義農業試驗分所自日治時期便積極投入甘藷種原蒐集工作，並自1922年開始進行雜交育種，迄今育成品種已至「台農74號」，用途包含飼料用、鮮食用、葉菜用及食品加工用，特性則包括高澱粉質、高蛋白質、高機能性成分(如花青素或類胡蘿蔔素)與耐儲藏性等；例如，「台農57號」具備高產量及口感、風味俱佳等特性、「台農66號」能適應多雨天候、「台農73號」則有獨特紫色藷肉且品質優良，以上各具特色的甘藷品種，現時仍廣受我國眾多消費者的喜愛。為延續甘藷產業的核心-育種及遺傳資源保存與應用，嘉義分所已累積蒐集超過1,400個甘藷品種(系)，來源涵蓋全球多個國家和地區，且成功運用植物組織培養技術備份保存重要之種原。

面對全球氣候暖化加劇，致災性暴雨或乾旱等極端天氣發生頻仍，為確保我國糧食安全及韌性農業永續發展目標，當時的行政院農業委員會(今農業部)乃責成本所積極籌建國家作物種原庫，並於1993年8月正式完工啟用，自此營運迄今已逾30年，累計蒐集與低溫冷藏保存重要糧食、蔬菜及特用作物種子超過10萬份。對於甘藷、山藥或馬鈴薯等無性繁殖作物種原，則設置具有空調和光照環境的組織培養室進行種苗離體保存；再定期將部份組織培養苗馴化移植至田間栽培並收集植株生育性狀等資料，這些近期由本所嘉義分所和遺傳生技組合作執行的調查成果彌足珍貴，將之彙集成冊也能彰顯種原保存的意義。

本書為一系列介紹甘藷種原各品種(系)外觀性狀和植株特性之第二本專輯，值此本所成立130週年及「台農57號」育成70週年之際，乃特別收錄歷年育成具代表性的甘藷品種，這些珍貴影像與性狀調查資料足以顯現甘藷種原的多樣性，更具有品種改良與試驗研究參考價值。本書能順利出版，承蒙農業部「作物種原庫系統維護及種原保存與利用」計畫(112農科-4.6.1-農-C2、113農科-4.6.1-農-02)及「根莖類作物種原保存及耐逆境品系之研究」計畫(112農科-4.6.1-農-C3、113農科-4.6.1-農-03)經費支持，特此申謝。

農業部農業試驗所

所長

王仕賢

中華民國一一四年十一月

編 者 按

為保存及活化更新甘藷種原，農業試驗所嘉義分所於民國111及112年秋作，與總所遺傳生技組合作，進行甘藷種原馴化移植與田間栽培繁殖作業。此外，於生育適期調查各品種(系)之農藝性狀，拍攝各部位彩色影像，以完整記錄其形態特徵。經篩除生長不良或受病蟲害影響嚴重之植株，最終收錄70個品種(系)，並彙編成冊。

為維持甘藷種原庫原始資料之完整性，本書仍保留使用各品種(系)原名稱、原單位碼及嘉義分所種原庫編號(附錄一)；此外，檢附溫室馴化及田間栽培照片(附錄二)，及補充甘藷品種性狀調查表填列定義及說明(附錄三)，列於書末供參閱。本圖說內容雖經審慎調查與編輯，惟仍難免有所疏漏，尚祈各界先進不吝指教，惠予補正。

本項甘藷種原保存及性狀調查工作得以順利完成，感謝同仁翁玉如小姐、林芷芸小姐協助甘藷種原組織培養及繼代繁殖工作；方翔先生、廖偉盛先生、賴巧玲小姐及周曉慧小姐協助種原溫室移植及馴化作業；後續田間插植、栽培管理工作承蒙周振東先生、邱顯仁先生及馬小娟小姐等同仁協助，特此一併致謝。

目　錄

序　言

編者按

台農10號 1

台農31號 2

台農36號 3

台農40號 4

台農51號 5

台農57號 6

台農59號 7

台農61號 8

台農63號 9

台農64號 10

台農65號 11

台農66號 12

台農67號 13

台農68號 14

台農69號 15

台農70號 16

台農71號 17

台農72號 18
台農73號 19
台農74號 20
白皮英哥 21
白尾白 22
白藤仔 23
Bnas-White 24
Centennial 25
Hdk 6 26
Anstralian Canner 27
Rose Centennial 28
Copper Skin Goldrush 29
台南14號 30
Hopi 31
Cherokee 32
Triumph 33
Redmar 34
I0076 (PI 208806) 35
PI 208886 36

ANG 16 37
Kanifuta 38
PI 286631 39
PI 308205 40
Qilin 41
PI 315343 42
PI 315350 43
Kumala Belep 44
Hou 45
PI 318858 46
PI 320448 47
PI 344120 48
HM 17 49
HM 288 50
Taiwan Unknown-3 51
Leaf Use (Yuan Lin) 52
L 7-182 53
Kinarauci (pala) 54
Kinarani (puti) 55
Binawa × Lubang 56

Upr × Vaniaga 57
農林3號.................................... 58
農林12號.................................... 59
農林21號.................................... 60
農林24號.................................... 61
農林31號.................................... 62
Kyushu 39 63
Kyukei 48 64
Kyukei 63 65
Kantou 33 66
Panjana 67
Feng Yuan Chung 68
Pai Wei Pai Mix 69
S 326 70
附錄一、甘藷種原品種名稱及編號................. 71
附錄二、甘藷種原溫室馴化及田間繁殖情形......... 76
附錄三、甘藷品種性狀調查表定義及說明........... 79

台農10號

甘藷性狀表

品種名稱：台農10號 (Tainung No. 10)
雜交親本：美國黃皮×紅皮

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)
1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm) ■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：□(1)無 □(2)少 □(3)中 ■(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支) ■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉
1. 成熟葉外緣缺刻深度：■(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色 □(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 ■(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：□(1)綠色 ■(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根
1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農31號

甘藷性狀表

品種名稱：台農31號 (Tainung No.31)
雜交親本：白和蘭×元地

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1.株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2.節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3.莖 蔓 色：□(1)紫色 ■(2)淡紫色 □(3)綠色
4.莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5.分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1.成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深 □(5)極深
2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) □(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
■(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5.葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
■(5)所有葉脈紫色
6.葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1.主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 ■(6)紫色
2.主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)



台農36號

甘藷性狀表

品種名稱：台農36號 (Tainung No.36)
雜交親本：幼藤仔×美國黃皮

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1.株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2.節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3.莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4.莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5.分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1.成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深　□(5)極深
2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5.葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色
6.葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1.主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2.主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農40號

甘藷性狀表

品種名稱：台農40號 (Tainung No. 40)
雜交親本：青心尾×台農14號

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：■(1)小(長<7cm；寬<6cm)　□(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)



台農51號

甘藷性狀表

品種名稱：台農51號 (Tainung No.51)
雜交親本：台農31號×台農45號

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1.株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2.節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3.莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4.莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5.分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1.成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深 □(5)極深
2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm)　■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5.葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
■(5)所有葉脈紫色
6.葉柄色：□(1)綠色 □(2)淡紫色 ■(3)紫色

三、塊根

1.主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2.主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農57號

甘藷性狀表

品種名稱：台農57號 (Tainung No. 57)

雜交親本：台農27號×Nancy Hall

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 ■(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：□(1)無　■(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) ■(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 ■(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm)　■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　■(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 ■(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農59號

甘藷性狀表

品種名稱：台農59號 (Tainung No. 59)

雜交親本：台農31號自交系×台農31號

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm)　□(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支)　□(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm)　■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   ■(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農61號

甘藷性狀表

品種名稱：台農61號 (Tainung No.61)
雜交親本：台農17號×Nancy Hall

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1.株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2.節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3.莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4.莖蔓茸毛：□(1)無　□(2)少 ■(3)中 □(4)多
5.分 支 數：□(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) ■(3)多(>25支)

二、葉

1.成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　　　　　　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5.葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　　　■(5)所有葉脈紫色
6.葉柄色：□(1)綠色 ■(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1.主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 ■(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2.主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　■(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)



台農63號

甘藷性狀表

品種名稱：台農63號(Tainung No.63)

雜交親本：多向雜交(Poly corss)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1.株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐

2.節 間 長：□(1)短(長<5cm) ■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)

3.莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色

4.莖蔓茸毛：□(1)無 ■(2)少 □(3)中 □(4)多

5.分 支 數：□(1)少(<11支) ■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1.成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深

2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) □(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
■(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)

4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

5.葉脈色：□(1)黃色 ■(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色

6.葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1.主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色

2.主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色 ■(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農64號

甘藷性狀表

品種名稱：台農64號(Tainung No. 64)
雜交親本：多向雜交(Poly corss)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)
1. 株　　型：☐(1)直立 ☐(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm) ☐(2)中(長5-10cm) ☐(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 ☐(2)淡紫色 ☐(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　☐(2)少　　☐(3)中　☐(4)多
5. 分 支 數：☐(1)少(<11支) ■(2)中(11-25支) ☐(3)多(>25支)

二、葉
1. 成熟葉外緣缺刻深度：☐(1)無 ■(2)輕微 ☐(3)中 ☐(4)深 ☐(5)極深
2. 成熟葉色　：☐(1)黃色 ☐(2)黃綠色 ■(3)綠色 ☐(4)紫色 ☐(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：☐(1)小(長<7cm；寬<6cm) ☐(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　■(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：☐(1)黃色 ☐(2)黃綠色 ■(3)綠色 ☐(4)紫色 ☐(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：☐(1)黃色　☐(2)綠色　☐(3)主脈一半為紫色 ■(4)主脈為紫色
　☐(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：☐(1)綠色 ☐(2)淡紫色 ■(3)紫色

三、塊根
1. 主塊根皮色：☐(1)白色 ☐(2)乳白色 ■(3)橙色 ☐(4)黃色 ☐(5)紅色 ☐(6)紫色
2. 主塊根肉色：☐(1)白色 ☐(2)黃色　■(3)橙色 ☐(4)紫色 ☐(5)其他(註明______色)



台農65號

甘藷性狀表

品種名稱：台農65號(Tainung No.65)
雜交親本：多向雜交(Poly corss)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1.株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2.節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3.莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4.莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5.分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1.成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) □(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
■(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5.葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　■(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色
6.葉柄色：□(1)綠色 □(2)淡紫色 ■(3)紫色

三、塊根

1.主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 ■(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2.主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　■(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農66號

甘藷性狀表

品種名稱：台農66號(Tainung No. 66)

雜交親本：多向雜交(Poly corss)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：□(1)無　■(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) □(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   ■(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　■(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農67號

甘藷性狀表

品種名稱：台農67號(Tainung No.67)
雜交親本：農林18號×Centennial

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1.株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2.節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3.莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4.莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5.分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1.成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) □(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
■(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5.葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　■(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色
6.葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1.主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2.主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農68號

甘藷性狀表

品種名稱：台農68號(Tainung No.68)
雜交親本：多向雜交(Poly corss)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)
1.株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2.節 間 長：□(1)短(長<5cm) ■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3.莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4.莖蔓茸毛：■(1)無 □(2)少 □(3)中 □(4)多
5.分 支 數：□(1)少(<11支) ■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉
1.成熟葉外緣缺刻深度：■(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5.葉脈色：□(1)黃色 ■(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色
6.葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根
1.主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2.主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農69號

甘藷性狀表

品種名稱：台農69號(Tainung No.69)
雜交親本：多向雜交(Poly corss)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1.株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2.節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3.莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4.莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5.分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1.成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) □(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
■(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5.葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色
6.葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1.主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2.主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　■(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農70號

甘藷性狀表

品種名稱：台農70號(Tainung No. 70)
雜交親本：多向雜交(Poly corss)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 ■(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：□(1)無　■(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明＿＿＿色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) □(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
■(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明＿＿＿色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　■(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　■(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明＿＿＿色)

台農71號

甘藷性狀表

品種名稱：台農71號(Tainung No.71)
雜交親本：多向雜交(Poly corss)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)
1.株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2.節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3.莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4.莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5.分 支 數：□(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) ■(3)多(>25支)

二、葉
1.成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5.葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色
6.葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根
1.主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2.主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農72號

甘藷性狀表

品種名稱：台農72號(Tainung No. 72)
雜交親本：多向雜交(Poly corss)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：■(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　■(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)



台農73號

甘藷性狀表

品種名稱：台農73號 (Tainung No. 73)

雜交親本：清水紫心×台農62號

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：■(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   ■(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 ■(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 ■(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台農74號

甘藷性狀表

品種名稱：台農74號 (Tainung No. 74)
雜交親本：多向雜交(Poly corss)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

白皮英哥

甘藷性狀表

品種名稱：白皮英哥

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)



白尾白

甘藷性狀表

品種名稱：白尾白

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)



白藤仔

甘藷性狀表

品種名稱：白藤仔

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1.株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐

2.節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)

3.莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色

4.莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多

5.分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1.成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深 □(5)極深

2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明＿＿＿色)

3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)

4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明＿＿＿色)

5.葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色

6.葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1.主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色

2.主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明＿＿＿色)



Bnas-White

甘藷性狀表

品種名稱：Bnas-White

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　■(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：□(1)綠色 ■(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約140天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：□(1)短(<3.5cm) ■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：□(1)狹(<3.5cm) □(2)中(3.5-4.5cm)　■(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：□(1)低於柱頭　■(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

四、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Centennial

甘藷性狀表

品種名稱：Centennial

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 ■(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：□(1)無　■(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：□(1)綠色 ■(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根(本期作無收穫到塊根)

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)



Hdk 6

甘藷性狀表

品種名稱：Hdk 6

一、植株（定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現）

1. 株　　型：☐(1)直立 ☐(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　 ☐(2)中(長5-10cm) ☐(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 ☐(2)淡紫色 ☐(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　 ☐(2)少 ☐(3)中 ☐(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　 ☐(2)中(11-25支) ☐(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：■(1)無 ☐(2)輕微 ☐(3)中 ☐(4)深 ☐(5)極深
2. 成熟葉色　：☐(1)黃色 ☐(2)黃綠色 ■(3)綠色 ☐(4)紫色 ☐(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：☐(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　☐(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：☐(1)黃色 ☐(2)黃綠色 ■(3)綠色 ☐(4)紫色 ☐(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：☐(1)黃色　 ☐(2)綠色　 ☐(3)主脈一半為紫色 ■(4)主脈為紫色
　☐(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：☐(1)綠色 ■(2)淡紫色 ☐(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：☐(1)白色 ☐(2)乳白色 ☐(3)橙色 ■(4)黃色 ☐(5)紅色 ☐(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 ☐(2)黃色　 ☐(3)橙色 ☐(4)紫色 ☐(5)其他(註明______色)

Anstralian Canner

甘藷性狀表

品種名稱：Anstralian Canner

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm)　□(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 ■(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 ■(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Rose Centennial

甘藷性狀表

品種名稱：Rose Centennial

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) □(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   ■(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根 (本期作無收穫到塊根)

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)



Copper Skin Goldrush

甘藷性狀表

品種名稱：Copper Skin Goldrush

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：□(1)無　□(2)少 □(3)中 ■(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：■(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　■(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

台南14號

甘藷性狀表

品種名稱：台南14號

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　■(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約53天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：□(1)短(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：□(1)狹(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花藥位置：□(1)低於柱頭　■(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

四、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Hopi

甘藷性狀表

品種名稱：Hopi

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) □(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   ■(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：□(1)綠色 □(2)淡紫色 ■(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 ■(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　■(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Cherokee

甘藷性狀表

品種名稱：Cherokee

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)



Triumph

甘藷性狀表

品種名稱：Triumph

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根(本期作無收穫到塊根)

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)



Redmar

甘藷性狀表

品種名稱：Redmar

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約53天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：□(1)短(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：□(1)狹(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：□(1)低於柱頭 ■(2)柱頭同高 □(3)高於柱頭

四、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

I0076

甘藷性狀表

品種名稱：I0076

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

PI 208886

甘藷性狀表

品種名稱：PI 208886

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　　■(2)綠色　　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

ANG 16

甘藷性狀表

品種名稱：ANG 16

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)
1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉
1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明_____色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明_____色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約89天始花)
1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明_____色)
2. 花 冠 長：□(1)短(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：□(1)狹(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：■(1)低於柱頭　□(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

四、塊根
1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明_____色)

Kanifuta

甘藷性狀表

品種名稱：Kanifuta

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：☐(1)直立 ■(2)半直立 ☐(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　☐(2)中(長5-10cm) ☐(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：☐(1)紫色 ■(2)淡紫色 ☐(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　☐(2)少 ☐(3)中 ☐(4)多
5. 分 支 數：☐(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) ☐(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：☐(1)無 ☐(2)輕微 ☐(3)中 ■(4)深 ☐(5)極深
2. 成熟葉色　：☐(1)黃色 ☐(2)黃綠色 ■(3)綠色 ☐(4)紫色 ☐(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：☐(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   ☐(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：☐(1)黃色 ☐(2)黃綠色 ■(3)綠色 ☐(4)紫色 ☐(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：☐(1)黃色　■(2)綠色　☐(3)主脈一半為紫色 ☐(4)主脈為紫色
   ☐(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 ☐(2)淡紫色 ☐(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：☐(1)白色 ☐(2)乳白色 ☐(3)橙色 ☐(4)黃色 ■(5)紅色 ☐(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 ☐(2)黃色　☐(3)橙色 ☐(4)紫色 ☐(5)其他(註明______色)

PI 286631

甘藷性狀表

品種名稱：PI 286631

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1.株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐

2.節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)

3.莖 蔓 色：□(1)紫色 ■(2)淡紫色 □(3)綠色

4.莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多

5.分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1.成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深

2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)

4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 □(3)綠色 ■(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

5.葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
■(5)所有葉脈紫色

6.葉柄色：□(1)綠色 ■(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約58天始花)

1.花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)

2.花 冠 長：□(1)短(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)

3.花 冠 寬：□(1)狹(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)

4.花藥位置：■(1)低於柱頭　□(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

四、塊根

1.主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色

2.主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

PI 308205

甘藷性狀表

品種名稱：PI 308205

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 □(3)綠色 ■(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　■(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約53天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：■(1)短(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：■(1)狹(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：■(1)低於柱頭　□(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

四、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Qilin

甘藷性狀表

品種名稱：Qilin

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

PI 315343

甘藷性狀表

品種名稱：PI 315343

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 □(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：□(1)短(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：□(1)狹(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：□(1)低於柱頭　□(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

四、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

PI 315350

甘藷性狀表

品種名稱：PI 315350

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 ■(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 ■(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約148天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：□(1)短(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：■(1)狹(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：■(1)低於柱頭 □(2)柱頭同高 □(3)高於柱頭

四、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Kumala Belep

甘藷性狀表

品種名稱：Kumala Belep

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：■(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 ■(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：□(1)綠色 □(2)淡紫色 ■(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Hou

甘藷性狀表

品種名稱：Hou

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 ■(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

PI 318858

甘藷性狀表

品種名稱：PI 318858

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)
1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：□(1)無　■(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉
1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明＿＿＿色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明＿＿＿色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　　□(2)綠色　■(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：□(1)綠色 □(2)淡紫色 ■(3)紫色

三、花(定植後約87天始花)
1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明＿＿＿色)
2. 花 冠 長：□(1)短(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：□(1)狹(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：■(1)低於柱頭　□(2)柱頭同高　　□(3)高於柱頭

四、塊根
1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明＿＿＿色)

PI 320448

甘藷性狀表

品種名稱：PI 320448

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 □(3)綠色 ■(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　■(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：□(1)綠色 □(2)淡紫色 ■(3)紫色

三、花(定植後約140天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：□(1)短(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：□(1)狹(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：□(1)低於柱頭　■(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

四、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

PI 344120

甘藷性狀表

品種名稱：PI 344120

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約87天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：□(1)短(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：■(1)狹(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：□(1)低於柱頭　■(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

HM 17

甘藷性狀表

品種名稱：HM 17

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立　□(2)半直立　■(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm)　□(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色　□(2)淡紫色　■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少　□(3)中　□(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支)　□(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無　■(2)輕微　□(3)中　□(4)深　□(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色　□(2)黃綠色　■(3)綠色　□(4)紫色　□(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm)　■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色　□(2)黃綠色　■(3)綠色　□(4)紫色　□(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　■(3)主脈一半為紫色　□(4)主脈為紫色
　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色　□(2)淡紫色　□(3)紫色

三、花(定植後約53天始花)

1. 花　　色：□(1)白色　□(2)淡紅色　■(3)紫色　□(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：■(1)短(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：■(1)狹(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：□(1)低於柱頭　■(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

四、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色　□(2)乳白色　□(3)橙色　□(4)黃色　■(5)紅色　□(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色　■(2)黃色　□(3)橙色　□(4)紫色　□(5)其他(註明______色)

HM 288

甘藷性狀表

品種名稱：HM 288

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 □(3)綠色 ■(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   ■(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：□(1)綠色 □(2)淡紫色 ■(3)紫色

三、花(定植後約53天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：□(1)短(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：□(1)狹(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：■(1)低於柱頭 □(2)柱頭同高 □(3)高於柱頭

四、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Taiwan Unknown-3

甘藷性狀表

品種名稱：Taiwan Unknown-3

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm)　□(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約53天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：□(1)短(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：□(1)狹(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：□(1)低於柱頭　■(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

四、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　■(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Leaf Use(Yuan Lin)

甘藷性狀表

品種名稱：Yuan Lin (Leaf Use)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立　■(2)半直立　□(3)匍匐
2. 節　間　長：■(1)短(長<5cm)　　□(2)中(長5-10cm)　□(3)長(長>10cm)
3. 莖　蔓　色：□(1)紫色　□(2)淡紫色　■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　　□(2)少　□(3)中　□(4)多
5. 分　支　數：□(1)少(<11支)　　■(2)中(11-25支)　□(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無　□(2)輕微　□(3)中　■(4)深　□(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色　□(2)黃綠色　■(3)綠色　□(4)紫色　□(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm)　■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色　□(2)黃綠色　■(3)綠色　□(4)紫色　□(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　　□(2)綠色　　■(3)主脈一半為紫色　□(4)主脈為紫色
　　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色　□(2)淡紫色　□(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色　□(2)乳白色　□(3)橙色　□(4)黃色　■(5)紅色　□(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色　□(2)黃色　　□(3)橙色　□(4)紫色　□(5)其他(註明______色)

L 7-182

甘藷性狀表

品種名稱：L 7-182

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) □(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
■(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
■(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約140天始花)

1. 花色：□(1)白色 ■(2)淡紅色 □(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花冠長：□(1)短(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花冠寬：□(1)狹(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：□(1)低於柱頭 ■(2)柱頭同高 □(3)高於柱頭

四、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 ■(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　■(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Kinarauci (pala)

甘藷性狀表

品種名稱：Kinarauci (pala)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm) □(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無 □(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支) ■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 ■(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色 □(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 ■(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：□(1)綠色 □(2)淡紫色 ■(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Kinarani (puti)

甘藷性狀表

品種名稱：Kinarani (puti)

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 ■(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明_____色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明_____色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 ■(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明_____色)

Binawa×Lubang

甘藷性狀表

品種名稱：Binawa×Lubang

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm) □(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無 □(2)輕微 ■(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) □(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   ■(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約53天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：■(1)短(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：■(1)狹(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：□(1)低於柱頭　■(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Upr×Vaniaga

甘藷性狀表

品種名稱：Upr × Vaniaga

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：　□(1)無　□(2)輕微 ■(3)中　□(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色 ■(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約76天始花)

1. 花色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花冠長：■(1)短(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花冠寬：■(1)狹(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花藥位置：■(1)低於柱頭 □(2)柱頭同高 □(3)高於柱頭

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色

農林 3號

甘藷性狀表

品種名稱：Norin 3

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm)　□(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 ■(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　■(2)中(11-25支)　□(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：　□(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 ■(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色 ■(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根 (本期作無收穫到塊根)

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

農林 12號

甘藷性狀表

品種名稱：Norin 12

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm) ■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無 □(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支) □(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度： ■(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色 ■(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約50天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：□(1)短(<3.5cm) ■(2)中(3.5-4.5cm) □(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：□(1)狹(<3.5cm) ■(2)中(3.5-4.5cm) □(3)闊(>4.5cm)
4. 花藥位置：□(1)低於柱頭 ■(2)柱頭同高 □(3)高於柱頭

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

農林 21號

甘藷性狀表

品種名稱：Norin 21

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：☐(1)直立 ☐(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　☐(2)中(長5-10cm) ☐(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：☐(1)紫色 ☐(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　☐(2)少 ☐(3)中 ☐(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　☐(2)中(11-25支) ☐(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：　☐(1)無　☐(2)輕微 ■(3)中　☐(4)深 ☐(5)極深
2. 成熟葉色：　☐(1)黃色 ☐(2)黃綠色 ■(3)綠色 ☐(4)紫色 ☐(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：☐(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   ☐(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：☐(1)黃色 ☐(2)黃綠色 ■(3)綠色 ☐(4)紫色 ☐(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：☐(1)黃色 ■(2)綠色 ☐(3)主脈一半為紫色 ☐(4)主脈為紫色
   ☐(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 ☐(2)淡紫色 ☐(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 ☐(2)乳白色 ☐(3)橙色 ☐(4)黃色 ☐(5)紅色 ☐(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 ☐(2)黃色　☐(3)橙色 ☐(4)紫色 ☐(5)其他(註明______色)



農林 24號

甘藷性狀表

品種名稱：Norin 24

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：　□(1)無　□(2)輕微 □(3)中　□(4)深 ■(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色 ■(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約85天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花 冠 長：■(1)短(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)
3. 花 冠 寬：■(1)狹(<3.5cm)　□(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：□(1)低於柱頭　■(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

四、塊根 (本期作無收穫到塊根)

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

農林 31號

甘藷性狀表

品種名稱：Norin 31

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：　□(1)無　□(2)輕微 ■(3)中　□(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色：　□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色 ■(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Kyushu 39

甘藷性狀表

品種名稱：Kyushu 39

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm) □(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無 □(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支) □(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度： □(1)無 □(2)輕微 □(3)中 □(4)深 ■(5)極深
2. 成熟葉色 ：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色 ■(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、花(定植後約77天始花)

1. 花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)
2. 花　冠長：□(1)短(<3.5cm) ■(2)中(3.5-4.5cm) □(3)長(>4.5cm)
3. 花　冠寬：■(1)狹(<3.5cm) □(2)中(3.5-4.5cm) □(3)闊(>4.5cm)
4. 花葯位置：■(1)低於柱頭 □(2)柱頭同高 □(3)高於柱頭

四、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 ■(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Kyukei 48

甘藷性狀表

品種名稱：Kyukei 48

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm) ■(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無 □(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支) □(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度： □(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色 ■(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Kyukei 63

甘藷性狀表

品種名稱：Kyukei 63

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5cm) □(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少　□(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無　□(2)輕微 □(3)中　□(4)深 ■(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　■(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Kantou 33

甘藷性狀表

品種名稱：Kantou 33

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：□(1)短(長<5cm)　■(2)中(長5-10cm)　□(3)長(長>10cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 ■(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支)　　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：　□(1)無　　□(2)輕微 □(3)中 □(4)深 ■(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色 ■(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Panjana

甘藷性狀表

品種名稱：Panjana

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1.株　　型：□(1)直立 ■(2)半直立 □(3)匍匐

2.節 間 長：■(1)短(長<5cm)　□(2)中(長5-10cm) □(3)長(長>10cm)

3.莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色

4.莖蔓茸毛：■(1)無　□(2)少 □(3)中 □(4)多

5.分 支 數：■(1)少(<11支)　□(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1.成熟葉外緣缺刻深度：□(1)無　■(2)輕微 □(3)中　□(4)深 □(5)極深

2.成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

3.成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)

□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)

4.未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

5.葉脈色：□(1)黃色　□(2)綠色　□(3)主脈一半為紫色 ■(4)主脈為紫色

□(5)所有葉脈紫色

6.葉柄色：□(1)綠色 □(2)淡紫色 ■(3)紫色

三、花(定植後約146天始花)

1.花　　色：□(1)白色 □(2)淡紅色 ■(3)紫色 □(4)其他(註明______色)

2.花 冠 長：□(1)短(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)長(>4.5cm)

3.花 冠 寬：□(1)狹(<3.5cm)　■(2)中(3.5-4.5cm)　□(3)闊(>4.5cm)

4.花葯位置：■(1)低於柱頭　□(2)柱頭同高　□(3)高於柱頭

四、塊根

1.主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色

2.主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　□(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Feng Yuan Chung

甘藷性狀表

品種名稱：Feng Yuan Chung

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5 cm) □(2)中(長5-10 cm) □(3)長(長>10 cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無 □(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：■(1)少(<11支) □(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度： □(1)無 □(2)輕微 □(3)中 ■(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色 ■(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 ■(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

Pai Wei Pai Mix

甘藷性狀表

品種名稱：Pai Wei Pai Mix

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：□(1)直立 □(2)半直立 ■(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5 cm)　□(2)中(長5-10 cm) □(3)長(長>10 cm)
3. 莖 蔓 色：□(1)紫色 □(2)淡紫色 ■(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無　 □(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支)　　■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度：　□(1)無　　□(2)輕微 □(3)中　 ■(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
　　□(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色　　■(2)綠色　 □(3)主脈一半為紫色 □(4)主脈為紫色
　　□(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：■(1)綠色 □(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：■(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 □(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：■(1)白色 □(2)黃色　 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

S 326

甘藷性狀表

品種名稱：S 326

一、植株(定植90天後觀察單株生育情形及外觀表現)

1. 株　　型：■(1)直立 □(2)半直立 □(3)匍匐
2. 節 間 長：■(1)短(長<5 cm) □(2)中(長5-10 cm) □(3)長(長>10 cm)
3. 莖 蔓 色：■(1)紫色 □(2)淡紫色 □(3)綠色
4. 莖蔓茸毛：■(1)無 □(2)少 □(3)中 □(4)多
5. 分 支 數：□(1)少(<11支) ■(2)中(11-25支) □(3)多(>25支)

二、葉

1. 成熟葉外緣缺刻深度： □(1)無 ■(2)輕微 □(3)中 □(4)深 □(5)極深
2. 成熟葉色　：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
3. 成熟葉面積：□(1)小(長<7cm；寬<6cm) ■(2)中(長7-13cm；寬6-12.5cm)
   □(3)大(長>13cm；寬>12.5cm)
4. 未成熟葉色：□(1)黃色 □(2)黃綠色 ■(3)綠色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)
5. 葉脈色：□(1)黃色 □(2)綠色 □(3)主脈一半為紫色 ■(4)主脈為紫色
   □(5)所有葉脈紫色
6. 葉柄色：□(1)綠色 ■(2)淡紫色 □(3)紫色

三、塊根

1. 主塊根皮色：□(1)白色 □(2)乳白色 □(3)橙色 ■(4)黃色 □(5)紅色 □(6)紫色
2. 主塊根肉色：□(1)白色 ■(2)黃色 □(3)橙色 □(4)紫色 □(5)其他(註明______色)

附錄一、甘藷種原品種名稱及編號

作物類別	品種名稱		原單位碼	嘉義分所種原庫編號
	中文	英文		
甘藷	台農10號	Tainung No. 10	NPI0154	CYSP4
甘藷	台農31號	Tainung No. 31	NPI0158	CYSP14
甘藷	台農36號	Tainung No. 36	NPI0283	CYSP16
甘藷	台農40號	Tainung No. 40	NPI0287	CYSP19
甘藷	台農51號	Tainung No. 51	NPI0294	CYSP25
甘藷	台農57號	Tainung No. 57	NPI0165	CYSP29
甘藷	台農59號	Tainung No. 59	NPI0166	CYSP31
甘藷	台農61號	Tainung No. 61	NPI0168	CYSP33
甘藷	台農63號	Tainung No. 63	NPI0171	CYSP35
甘藷	台農64號	Tainung No. 64	NPI0425	CYSP36
甘藷	台農65號	Tainung No. 65	NPI0430	CYSP37
甘藷	台農66號	Tainung No. 66	NPI0981	CYSP38
甘藷	台農67號	Tainung No. 67	NPI1220	CYSP39
甘藷	台農68號	Tainung No. 68	NPI1221	CYSP40
甘藷	台農69號	Tainung No. 69	NPI1672	CYSP41

作物類別	品種名稱		原單位碼	嘉義分所種原庫編號
	中文	英文		
甘藷	台農70號	Tainung No. 70	NPI1673	CYSP42
甘藷	台農71號	Tainung No. 71	NPI1674	CYSP43
甘藷	台農72號	Tainung No. 72	NPI1675	CYSP44
甘藷	台農73號	Tainung No. 73	NPI1676	CYSP45
甘藷	台農74號	Tainung No. 74	--	CYSP1643
甘藷	白皮英哥		--	CYSP97
甘藷	白尾白		--	CYSP102
甘藷	白藤仔		--	CYSP127
甘藷		Bnas-White	NPI0001	CYSP267
甘藷		Centennial	NPI0003	CYSP269
甘藷		Hdk 6	NPI0015	-
甘藷		Anstralian Canner	NPI0027	CYSP316
甘藷		Rose Centennial	NPI0031	CYSP290
甘藷		Copper Skin Goldrush	NPI0036	CYSP294
甘藷	台南14號	Tainan 14	NPI0058	CYSP310

作物類別	品種名稱		原單位碼	嘉義分所種原庫編號
	中文	英文		
甘藷		Hopi	NPI0061	CYSP312
甘藷		Cherokee	NPI0063	CYSP314
甘藷		Triumph	NPI0066	CYSP317
甘藷		Redmar	NPI0067	CYSP318
甘藷		I0076 (PI 208806)	NPI0076	CYSP324
甘藷		PI 208886	NPI0077	CYSP325
甘藷		ANG 16	NPI0081	CYSP328
甘藷		Kanifuta	NPI0082	CYSP329
甘藷		PI 286631	NPI0085	CYSP331
甘藷		PI 308205	NPI0091	CYSP335
甘藷		Qilin	NPI0093	CYSP336
甘藷		PI 315343	NPI0094	CYSP337
甘藷		PI 315350	NPI0097	CYSP340
甘藷		Kumala Belep	NPI0100	CYSP342
甘藷		Hou	NPI0101	CYSP343

作物類別	品種名稱		原單位碼	嘉義分所種原庫編號
	中文	英文		
甘藷		PI 318858	NPI0105	CYSP346
甘藷		PI 320448	NPI0107	CYSP348
甘藷		PI 344120	NPI0112	CYSP353
甘藷		HM 17	NPI0128	CYSP363
甘藷		HM 288	NPI0132	CYSP365
甘藷		Taiwan Unknown-3	NPI0188	CYSP403
甘藷		Leaf Use (Yuan Lin)	NPI0189	CYSP404
甘藷		L 7-182	NPI0196	CYSP408
甘藷		Kinarauci (pala)	NPI0205	CYSP416
甘藷		Kinarani (puti)	NPI0214	CYSP422
甘藷		Binawa × Lubang	NPI0218	CYSP426
甘藷		Upr × Vaniaga	NPI0219	CYSP427
甘藷	農林3號	Norin 3	NPI0233	-
甘藷	農林12號	Norin 12	NPI0242	CYSP440
甘藷	農林21號	Norin 21	NPI0251	CYSP448

作物類別	品種名稱		原單位碼	嘉義分所種原庫編號
	中文	英文		
甘藷	農林24號	Norin 24	NPI0254	CYSP449
甘藷	農林31號	Norin 31	NPI0261	CYSP453
甘藷		Kyushu 39	NPI0302	CYSP474
甘藷		Kyukei 48	NPI0305	CYSP475
甘藷		Kyukei 63	NPI0307	CYSP477
甘藷		Kantou 33	NPI0309	-
甘藷		Panjana	NPI0311	CYSP479
甘藷		Feng Yuan Chung	NPI0336	CYSP489
甘藷		Pai Wei Pai Mix	NPI0338	CYSP490
甘藷		S 326	NPI0983	CYSP895

附錄二、

111及112年甘藷種原溫室馴化及田間繁殖情形



圖1. 甘藷種原(組培苗)移植前消毒處理(攝於2022年07月)。

圖2. 甘藷種原移植作業(攝於2022年07月)



圖3. 甘藷種原於溫室馴化(攝於2022年07月)。

圖4. 111年秋作甘藷種原於田間定植約30天(攝於2022年10月)。



圖5. 甘藷種原移植及馴化作業(攝於2023年06月)。

圖6. 112年秋作甘藷種原於田間定植約60天(攝於2023年12月)。

附錄三、甘藷品種性狀調查表定義及說明

參考農業部農糧署植物品種試驗檢定方法及品種性狀表

HTTPS://PVR.AFA.GOV.TW/RIGHTMAINTAINPLANTSPECIESANDTESTGUIDELINES

一、植株

性　狀	定　義
1. 株型	種植後約90天後之生長習性。
2. 節間長	種植後約90天調查自主莖頂梢數起第15–20個節間長，共調查10株節間長度之平均。調查級數分別為短：少於5公分；中：5公分至10公分；長：多於10公分。
3. 莖蔓色	種植後約90天調查自主莖頂梢數起第15個至20個之莖蔓色。
4. 莖蔓絨毛	種植後約90天調查有無莖蔓茸毛。
5. 分支數	種植後約90天調查株高5公分以上之分枝數，共調查10株之平均。調查級數分別為少：少於11支；中：11支至25支；多：多於25支。

二、葉

性　狀	定　義
1. 成熟葉外緣缺刻深度	如附圖1。種植後約90天依葉片外緣缺刻深淺調查自頂梢數起主莖第15個至20個節之葉形。
2. 成熟葉色	種植後約90天後調查自主莖頂梢數起第15個至20個節之葉片顏色。
3. 成熟葉面積	種植後約90天後調查自主莖頂梢數起第15個至20個節之10葉片平均。調查級數分別為小(長：小於7公分，寬：小於6公分)；中(長：7公分至13公分，寬:6公分至12.5公分)；大(長：大於13公分，寬：大於12.5公分)。

性　狀	定　義
4. 未成熟葉色	種植後約90天後頂葉之顏色。
5. 葉脈色	種植後約90天後調查自主莖頂梢數起第15個至20個節之葉背脈色。
6. 葉柄色	種植後約90天調查自主莖頂梢數起第15個至20個節之葉柄顏色。

三、花朵

性　狀	定　義
1. 花色	調查開花盛期花之顏色。
2. 花冠長	如附圖2。完全展開之花朵自頂端至底部之長度，共調查10朵花之平均。調查級數分別為短：少於3.5公分；中:3.5公分至4.5公分；長：多於4.5公分。
3. 花冠寬	如附圖2。完全展開之花朵兩側之寬度，共調查10朵花之平均。調查級數分別為狹：少於3.5公分；中：3.5公分至4.5公分；闊：多於4.5公分。
4. 花葯位置	如附圖3。調查完全展開花之花藥與柱頭之相對位置。

四、塊根

性狀	定　義
1. 主塊根皮色	收穫時調查主塊根皮色，分成白色、乳白色、橙色、黃色、紅色及紫色等。
2. 主塊根肉色	收穫時調查主塊根肉色，分成白色、黃色、橙色及紫色等。



附圖1. 成熟葉外緣缺刻深度類型



附圖2. 花冠長及花冠寬定義範圍



附圖3. 花葯與柱頭相對位置

備註：

分別於民國111年與112年秋作期間，進行甘藷種原田間栽培管理及性狀調查，以經溫室馴化後之甘藷品種(系)為材料，扦插於農業試驗所嘉義分所之水源地農場。每一甘藷品種(系)種植1–2株，行距約1.0公尺，株距約0.25公尺。種植前先行整地作畦，肥料用量為每公頃110(N)–55(P_2O_5)–220(K_2O)公斤，作為基肥一次施用，其餘栽培管理及病蟲害防治依一般甘藷田間管理模式進行。於種植後約90天調查單株之莖蔓、葉等地上部性狀；栽培期約150天，收穫後進行主塊根皮色及主塊根肉色之調查。

農業部農業試驗所特刊第250號

書　　名：甘藷種原圖說(二)

Ipomoea batatas (L.) Lam. Germplasm Illustrations (Ⅱ)

發 行 人：王仕賢

編　　著：陸柏憲、蕭翌柱、賴永昌、陳述

出 版 者：農業部農業試驗所

地　　址：41362 台中市霧峰區萬豐里中正路189號

No.189, Zhongzheng Rd., Wufeng Dist., Taichung City 41362, Taiwan (R.O.C.)

電　　話：04-23302301　傳真：04-23338162

網　　址：https://www.tari.gov.tw

出版年月：民國114年11月 初版

農試所出版品 2025年－07號

ISBN：978-626-7651-92-6 (PDF)

GPN：4711400106

電子書設計製作：蘭潭彩色印刷股份有限公司

地　　址：600嘉義市西區興業西路500號

電　　話：05-2365493

電子郵件：lt2856096@gmail.com

電子書播放資訊

作業系統：Windows, Mac

檔案格式：Adobe PDF

檔案內容：2D

播放軟體：PDF Reader

使用載具：PC、智慧型手機、平板